

زگیلهای مقعدی (Warts Anal) (Condyloma)

زگیل مقعدی چیست؟

زگیلهای مقعدی که به عنوان کندیلوما نیز شناخته میشوند، توده ها یا برجستگی های کوچکی هستند که در پوست اطراف مقعد یا انتهای رکتوم دیده میشوند.

علت زگیل های مقعدی چیست؟

زگیلهای مقعدی ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی است که معمولاً از طریق ارتباط جنسی منتقل میشود اما الزاماً به دلیل ارتباط جنسی از طریق مقعد نمی باشد. انواع متعددی از ویروس پاپیلومای انسانی وجود دارد، که بعضی از آنها ایجاد زگیل روی دستها و پا می کنند و بعضی از آنها سبب زگیلهای ناحیه تناسلی و مقعدی میشوند. این زگیلها در مردان در آلت تناسلی و کیسه بیضه (اسکروتوم) و در واژن و نواحی تناسلی خانم ها نیز دیده میشود. زمان برخورد با ویروس تا ایجاد زگیل معمولاً بین یک تا 6 ماه طول می کشد ولی ممکن است طولانی تر نیز باشد. در طی این مدت ویروس در بافت ها می ماند ولی غیر فعال است.

